

使用上の注意

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘
3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

カルシウム不足、栄養補給を目的としたカルシウムの補足、授乳期及び小児の発育期のカルシウムの補給源。

用法・用量

成人は1日量40mLを3回にわけて空腹時に服用します。
小児は成人の半量です。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)服用前はお茶を飲まないで下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3)定められた用法・用量を守って下さい。

容量 600mL

開栓年月日

開栓時にご記入下さい



カップ
カップ包

ガラス:びん
金属:キャップ

タチカワ 電解カルシウム



第3類医薬品

成分・分量

本品は100mL中、カルシウム[Ca⁺⁺]として80mgを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)服用後は密栓し、冷蔵庫に立てて保管して下さい。
- (3)液はなるべく振らないで下さい。
- (4)添付の計量カップは、ご使用のつど水洗いなどして常に清潔に保管して下さい。
- (5)本品を使用中、ビン口のまわりが白くなる場合がありますが、これは空気により酸化されたカルシウム結晶ですので、服用には差し支えありません。
- (6)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (7)誤用の原因になったり、品質が変わることがありますので、他の容器に入れ替えないで下さい。
- (8)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元

森田薬品工業株式会社

広島県福山市大門町野々浜1059番地
お客様相談室：電話(084)943-8171

使用期限

製造番号